

Nueva cita de *Messor celiae* Reyes, 1985 (*Hym. Formicidae*)

Esta especie fue descrita a partir de una serie recogida en las inmediaciones de Córdoba (REYES, 1985) y desde entonces no había vuelto a ser citada. Nosotros la señalamos de Coria del Río (UTM: 30STG3161) pequeña localidad cercana a Sevilla.

Recogimos (30-X-88) un total de diecisiete obreras y un macho al borde de un camino en las inmediaciones de un olivar, es decir, en un biotopo similar al descrito para la serie tipo.

Esta nueva cita contribuye no sólo a ampliar el área de distribución de la especie sino sobre todo a confirmar la validez y las características de la misma, basadas principalmente en el tamaño del macho y también por el epinoto y peciolos menos pubescentes en las obreras de *M. celiae* que en las de *M. hispanicus* Santschi, 1919 que es la especie efectivamente más parecida. Sin embargo pensamos que la coincidencia en el biotopo debe ser producto de la casualidad pues, por muy antiguo que sea el cultivo del olivo en nuestro país, no creemos que haya sido lo suficiente como para haber dado lugar a la formación de una especie específica del mismo, por lo que el área primitiva o de origen de esta especie debe situarse en otro tipo de biotopo.

BIBLIOGRAFÍA

REYES, J.L. 1985. Descripción de *Messor celiae* nov. sp. (*Hym. Formicidae*). *Bol. Asoc. esp. Ent.* 9: 255-261.

Fecha de recepción: 30 de diciembre de 1988

Fecha de aceptación: 25 de abril de 1988

Alberto Tinaut
Dpto. Biología Animal,
Ecología y Genética
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada
18073 GRANADA (España)